









```
215.378217,     168.441435,     807.212395,
214.841855,     168.734571,     807.190601,
214.349524,     168.905925,     807.191032,
214.132508,     168.896292,     807.195901,
213.906944,     168.917930,     807.197885,
213.655593,     169.038152,     807.190953,
213.369760,     169.298743,     807.171716,
212.894543,     169.475741,     807.160146,
212.659844,     169.561069,     807.153752,
212.423830,     169.659040,     807.146654,
212.195576,     169.729792,     807.139817,
211.971379,     169.788222,     807.134897,
211.774401,     169.732949,     807.122336,
211.395410,     169.548067,     807.140732,
210.021949,     170.213169,     807.080264,
209.148356,     170.585293,     807.060870,
```

xy=2496210.029537,283170.166185,806.886387
xy=2496216.389793,283168.125847,807.224231
xy=2496216.131188,283168.213754,807.202574
xy=2496215.862398,283168.341261,807.212886
xy=2496215.584891,283168.501722,807.204684
xy=2496215.378217,283168.441435,807.212395
xy=2496214.841855,283168.734571,807.198601
xy=2496214.349524,283168.905925,807.191032














test7.dtm data














test7.dtm data






Area Cut : 190.09
Area Fill : 0.27
830
820
810
86.35


96.35










0+507
0
20







Conclusion

- Cyrax data must be reduced
  - Every 10th point was used here.
  - A gridded model from raw data is more uniform.
- Inroads looks down in a top view, Cyrax views from a ground perspective
  - Expect modeling errors at overhangs.
  - Rotate the model if needed.