



¿Qué es el implante anticonceptivo?

El implante, llamado Nexplanon®, es una varilla de plástico del tamaño de un cerillo aproximadamente (unas 2 pulgadas). Un proveedor de atención médica coloca la varilla debajo de la piel en la parte superior del brazo. Dura 3 años.

¿Cómo funciona?

El implante impide que:

- Los ovarios liberen óvulos.
- El espermatozoides pase al útero.
- Los óvulos fertilizados se adhieran al útero.

¿Cuán eficaz es el implante?

- El implante tiene una eficacia del 99%.
- *Es el método anticonceptivo más eficaz de todos.*

¿Por qué habría de usar el implante?

- Dura 3 años.
- No hay nada que recordar después de haberse colocado.
- Con el implante se puede dar de lactar sin problemas.
- La dosis de hormonas es muy baja y tiene pocos efectos secundarios.
- Disminuye el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres.
- Es práctico y le brinda tranquilidad.

¿Cómo se usa el implante?


- Quizá sea necesario que utilice un método anticonceptivo de apoyo con el implante durante los primeros 7 días.
- El implante debe retirarse cada 3 años, pero puede retirarse antes.

¿Qué tipo de efectos secundarios son comunes?


Sus periodos cambiarán. Cuando se le retire el implante, sus periodos volverán a como eran antes de que le colocaran el implante.

- **La mayoría** de las mujeres presentan un leve sangrado esporádicamente.
- Puede dejar de tener periodos.
- **Algunas** mujeres presentan:
 - Cambios de humor,
 - Dolores de cabeza.

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen al retirarse el implante.



Se coloca debajo de la piel en la **parte interna de la parte superior del brazo**



¿Qué debo hacer si quiero que me retiren el implante?

- Vaya a ver a un proveedor que retire implantes.
- Si desea seguir usando el implante, pida que le coloquen otro cuando le retiren el que tiene.
- No se olvide de usar otro método anticonceptivo de inmediato si no desea quedar embarazada.

¿Hay riesgos con el implante?

- No protege de las ETS o del VIH. Use condones.
- Después de colocársele el implante en el brazo, usted podría presentar dolor, irritación, hinchazón, magulladura o infección.
- Su remoción podría ser difícil.



Llame a su proveedor de atención médica si presenta:

- Dolores de cabeza severos o más frecuentes, sangrado fuerte o dolor en el abdomen.
- Pus, sangrado, irritación o dolor sobre el implante.

Llame a su proveedor de atención médica si no siente el implante debajo de la piel.

Llame al 9-1-1 o acuda a la sala de emergencias si presenta:

- Dolor con presión en el pecho.
- Cambios súbitos de la vista.

Para ver si puede obtener métodos anticonceptivos gratis o de bajo costo en Oregon, llame al 2-1-1 o visite ccare.oregon.gov

Oregon
Health
Authority


PUBLIC HEALTH DIVISION

Llame al 971-673-0355 para obtener este panfleto en otro formato: letra grande, otros idiomas, Braille y grabaciones de audio, entre otros.

Puede descargar este panfleto en www.healthoregon.org/rh e imprimirlo.

Financiado en parte por una subvención de la OPA del DHHS de EE.UU.
2013

Implante anticonceptivo



¡El implante es el método anticonceptivo más eficaz de todos!

Programa de Salud Reproductiva de Oregon