



Cuando me alimentes con **Fórmula**

Enlaces rápidos:

- [Señales de hambre](#)
- [Señales de plenitud](#)
- [5 consejos para alimentarme](#)
- [Cuanto fórmula puedo tomar](#)
- [Prepara y guarda mi fórmula con cuidado](#)
- [Cómo cambiar a una nueva fórmula](#)
- [Consejos generales](#)



Aliméntame cuando demuestre que tengo hambre

Identifica algunas de estas señales de hambre y aliméntame antes de que comience a llorar.

Voy a:

- tener mis manos cerca de mi boca;
- doblar mis brazos y piernas hacia mi cuerpo;
- hacer sonidos de succión;
- fruncir mis labios;
- buscar el chupón.



Deja de alimentarme cuando demuestre que estoy lleno

Puedo llenarme antes de acabarme el biberón. Identifica estas señales de que estoy lleno.

Voy a:

- succionar más despacio o dejar de succionar;
- relajar mis manos y brazos;
- alejarme del chupón;
- empujar;
- quedarme dormido.



Mi estómago es muy pequeño, como del tamaño de mi puño. Necesito que me alimentes con porciones pequeñas y con frecuencia.



5 consejos para alimentarme

1

Siempre sostenme a mí y al biberón.



2

Sostenme casi erguido para que pueda ver tu rostro. Mi cabeza necesita estar más arriba que mi pecho y no inclinada hacia atrás.



3

Frota el chupón del biberón a lo largo de mi labio superior. Espera a que abra mi boca.

4

Para alimentarme, mantén mi biberón a un nivel casi horizontal. El chupón se va a llenar con algo de fórmula. Esta posición me dejará succionar la fórmula de la botella a un ritmo cómodo.



5

Déjame detenerme y descansar cada ciertas succiones. Sé paciente. Puedo alimentarme por alrededor de 15 a 20 minutos. Ayúdame a eructar con frecuencia.



Cuánta fórmula puedo tomar

Podría tomar cada 3 o 4 horas, a veces incluso más. Es posible que no siempre tome la misma cantidad. Mantente alerta a mis señales de hambre y de que estoy lleno.



Nacimiento a 2 meses

hasta 2 o 3 onzas



2 a 4 meses

3 a 4 onzas



4 a 6 meses

4 a 6 onzas



6 a 8 meses

6 a 8 onzas




8 a 12 meses

4 a 6 onzas

Prepara y guarda mi fórmula con cuidado

1

Revisa la fecha de caducidad y el estado del envase. No compres fórmula con fecha caducada. Evita los envases dañados.




2

Lávate las manos con agua y jabón. Seca tus manos.



3

Limpia el área de preparación. Limpia el envase, la tapa y el abridor de la fórmula (si lo usas).




4

Lava los biberones y las partes de los biberones con jabón y agua caliente, o lávalos todos los días en el lavavajillas usando agua caliente y un ciclo de secado con calor.



5

Usa agua de la llave fría o a temperatura ambiente que provenga de una fuente segura para preparar mis biberones. No uses agua de la llave caliente porque puede contener plomo u otros minerales dañinos de las tuberías.



Si estás preocupada por la calidad del agua, consúltalo con tu departamento de salud o proveedor de salud local. Pregúntales si necesitas usar agua nursery embotellada, agua de la llave hervida y luego enfriada, o biberones y sus partes sanitizadas.

Consulte con su proveedor de atención médica. Es posible que desee tomar medidas adicionales para hervir el agua

- si su bebé tiene menos de 3 meses,
- nació prematuramente
- tiene un sistema inmunológico debilitado.

Usar agua caliente (por encima de los 158°F) para preparar la fórmula ayuda a eliminar los gérmenes que puedan haber en la fórmula en polvo. Hierva el agua y déjela enfriar durante unos 5 minutos. Prepare cuidadosamente la fórmula. Enfríela a temperatura corporal antes de alimentar.


Fórmula en polvo

- Sigue las instrucciones de la etiqueta.
- Mide el agua y ponla en un biberón limpio.
- Con una cuchara limpia y seca del contenedor, añade la cantidad correcta de polvo al biberón con el agua. Por cada 2 onzas de agua, añade 1 cuchara al ras de la fórmula en polvo.
- Coloca la tapa y el chupón. Agítalo bien.



Fórmula concentrada

- Sigue las instrucciones de la etiqueta.
- Agita la lata para mezclar, antes de abrirla.
- Vacía la fórmula de la lata en un envase limpio.
- Llena la lata con agua y agrégala a la fórmula en el envase.
- Mezcla.
- Vierte la cantidad deseada de fórmula preparada en los biberones limpios. Coloca la tapa y el chupón.
- O, para biberones individuales, mezcla cantidades iguales de fórmula concentrada y agua en el biberón.



7

Almacenar la fórmula

- Almacena la fórmula en el refrigerador hasta por 24 horas.
- Usa la fórmula preparada que saques del refrigerador dentro de 2 horas.
- Una vez que comiences a alimentarme, usa el biberón con fórmula durante la siguiente hora.
- Vacía toda la fórmula que quede en el biberón después de alimentarme.
- Almacena la lata abierta del concentrado en el refrigerador hasta por 48 horas.
- Almacena los envases abiertos de fórmula en polvo en un lugar fresco y seco hasta por un mes.

**8**

Para obtener más información sobre cómo preparar y almacenar la fórmula, vaya al los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

- Preparación y almacenamiento de la leche de fórmula infantil – <https://bit.ly/3N7bzBq>
- Cómo limpiar, desinfectar y guardar los artículos de alimentación del bebé – <https://bit.ly/3lb3tvu>
- La infección por Cronobacter y los bebés – <https://bit.ly/3N981hX>

Cambiar a su bebé a una fórmula nueva

Si necesita cambiar de una fórmula a otra, es más fácil para su bebé si lo hace gradualmente a lo largo de varios días, en lugar de cambiar inmediatamente. ***Si su bebé está tomando una fórmula médica especial, siga las instrucciones de su doctor para cambiar fórmulas.***

La mayoría de los bebés pueden tomar cualquier fórmula. Cada una sabe un poco diferente. Algunos bebés tal vez noten esta diferencia y ayudará si empieza el cambio a la fórmula nueva despacio. Aquí tenemos un método para cambiar a su bebé a una fórmula nueva.



Cómo cambiar a una fórmula EN POLVO NUEVA

(Ejemplo de una botella de 8 onzas)

Va a necesitar unas 2 latas de la fórmula vieja para mezclar con la nueva fórmula. Siempre agregue el agua primero a la botella antes de agregar la fórmula en polvo.

Empiece con (los primeros días)	
Llene la botella con 8 onzas de agua. Agregue: 1 cucharadita fórmula nueva 3 cucharaditas fórmula vieja	
Luego intente (los siguientes días)	
Llene la botella con 8 onzas de agua. Agregue: 2 cucharaditas fórmula nueva 2 cucharaditas fórmula vieja	
Más adelante (alrededor del séptimo día, o después si es necesario)	
Llene la botella con 8 onzas de agua. Agregue: 3 cucharaditas fórmula nueva 1 cucharadita fórmula vieja	
Finalmente, sólo fórmula nueva	
Llene la botella con 8 onzas de agua. Agregue: 4 cucharaditas fórmula nueva	

Cómo cambiar a una fórmula

CONCENTRADA LÍQUIDA NUEVA


(Ejemplo de una botella de 8 onzas)

Va a necesitar 6-8 latas de la fórmula líquida vieja para mezclar con la nueva.

Empieze con (los primeros días)	
Mezclar: 4 onzas de agua 1 onza fórmula nueva 3 onzas fórmula vieja	
Luego intente (los siguientes días)	
Mezclar: 4 onzas de agua 2 onzas fórmula nueva 2 onzas fórmula vieja	
Más adelante (alrededor del séptimo día, o después si es necesario)	
Mezclar: 4 onzas de agua 3 onzas fórmula nueva 1 onza fórmula vieja	
Finalmente, sólo fórmula nueva	
Mezclar: 4 onzas de agua 4 onzas fórmula vieja	

Consejos generales


¡Añade la cantidad correcta de agua! Es peligroso para mí si hay mucha agua o es insuficiente. Podría enfermarme gravemente o no crecer bien.



Si quieres calentar mi biberón, ponlo en una pequeña olla de agua caliente. Revisa la temperatura antes de alimentarme goteando un poco en tu muñeca. No calientes mis biberones en el microondas.



Guarda mi fórmula preparada en una bolsa aislante o en una hielera con una bolsa de hielo para mantenerla fría cuando salgamos de casa. Úsala dentro de las siguientes 24 horas.



Pon únicamente fórmula, agua o leche materna en mi biberón. No pongas nada como cereal, comida para bebés, miel o jugo en mi biberón. Podría ahogarme, enfermarme, sufrir deterioro dental y comer demasiado.



Escupir es normal. Si escupo demasiado, sigue estos consejos:

- Aliméntame con porciones más pequeñas con más frecuencia.
- Sostenme más erguido.
- Haz una pausa y ayúdame a eructar con más frecuencia.
- Mantenme erguido por alrededor de 20 a 30 minutos después de haber comido.
- Revisa el agujero en el chupón de mi biberón para asegurarte de que no sea muy grande.
- Mantenme tranquilo.
- Consulta con mi proveedor de salud si te parece que estoy escupiendo demasiado.



Nunca me acuestes con mi biberón. Podría ahogarme, escupir, contraer infecciones en los oídos o sufrir deterioro dental.



Es posible que WIC no pueda proveer toda la fórmula que tu bebé necesita, especialmente después de que tu bebé cumpla los 6 meses. Este folleto es para bebés saludables y nacidos a término que tomen fórmulas regulares, no especiales ni terapéuticas. Si piensas que tu bebé necesita una fórmula especial, habla con tu proveedor de salud o nutricionista de WIC.



57-792 (7/2022) SPAN

Oregon
Health
Authority

wic OREGON

Creado por el programa WIC de California y utilizado con autorización.