



Сибирская язва

Что такое сибирская язва?

Сибирская язва - это бактериальное заболевание, которое чаще всего поражает животных: крупный рогатый скот, свиней, овец и коз. Ее бактерии формируют споры, которые могут выживать в окружающей среде в течение долгого периода времени. Люди редко болеют сибирской язвой, но если они заболевают, то это происходит через уход за больными животными или контакт с другими инфицированными предметами, содержащими споры сибирской язвы, а также через употребление зараженного мяса или вдыхание спор. Сибирская язва не может передаваться от человека к человеку.

Виды сибирской язвы и симптомы

Заразиться сибирской язвой можно тремя путями; у каждого из них свои симптомы. Симптомы обычно появляются через 1-7 дней после заражения, но могут не проявляться до двух месяцев. Типы сибирской язвы и симптомы:

- **Легочная форма** сибирской язвы - это самый серьезный вид сибирской язвы, вызываемый вдыханием спор в легкие. Сначала он напоминает грипп или обычную простуду. У больного может быть температура, кашель, головная боль, озноб, слабость, затруднение дыхания и неприятные ощущения в груди. Через несколько дней болезнь может вызвать серьезные дыхательные проблемы и шок. Этот вид сибирской язвы часто может быть смертельным, если своевременное лечение не будет оказано. Тот, кто использует сибирскую язву как оружие, скорее всего, выпустит ее в воздух, для заражения путем вдыхания.
- **Кожная форма** сибирской язвы может быть вызвана попаданием бактерий в организм через порезы или повреждения на коже. Один из ранних симптомов – появление зудящих шишек. Позднее может появиться небольшой волдырь, и превратиться в ранку с черным центром, которая не болит. Еще один симптом – опухшие лимфатические узлы.
- **Кишечная форма** сибирской язвы вызвана проглатыванием бактерий. Это повреждает желудочно-кишечный тракт. Ранние симптомы: тошнота, рвота, потеря аппетита и жар. Позднее могут появиться боли в животе, рвота с кровью и сильный понос.

Распознавание возможного заражения сибирской язвой

- Если у вас появились симптомы, обратитесь к врачу. Если вы считаете, что вас умышленно заразили сибирской язвой, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
- Если вы получите письмо или посылку, в которых могут быть возбудители сибирской язвы:
 - Осторожно положите пакет. Не трогайте его – от этого споры могут подняться в воздух.
 - Сразу же тщательно вымойте руки теплой водой с мылом.
 - Позвоните 9-1-1 и сообщите, что произошло. Выполняйте указания оператора, пока не придет помощь.
 - Помните: ничего не делайте с пакетом.

Лечение сибирской язвы

- Антибиотики следует использовать для профилактики или лечения сибирской язвы только по указанию врачей или под контролем местного департамента здравоохранения. Все виды сибирской язвы необходимо лечить без промедления.
- Обращайтесь за лечением только в случае прямого контакта с бактериями сибирской язвы. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Людям, которые были рядом с больным (родственникам, друзьям, сотрудникам), опасность не угрожает за исключением случаев, когда они были подвержены тому же источнику заражения.

Oregon
Health
Authority

Public Health Division
800 NE Oregon St.
Suite 465 B
Portland, OR 97232

Веб-сайт:
[healthoregon.org/
preparedness](http://healthoregon.org/preparedness)

971-673-1315

HSPR Pub 12-3-12
Russian