


Lesiones causadas por fentanilo con xilacina

¿Qué es la xilacina?

La xilacina ("tranq") es un tranquilizante para animales que se está volviendo cada vez más común en el suministro de drogas ilícitas en todo el país. La están mezclando con otras drogas ilícitas, especialmente el fentanilo. Al igual que el fentanilo, la xilacina puede causar sedación, pérdida del conocimiento, respiración reducida y dependencia. Aunque la naloxona no funciona con la xilacina, se debe administrar naloxona siempre que se sospeche que hay una sobredosis, ya que ayudará si hay fentanilo u otro opioide involucrado. Si cree que alguien ha tenido una sobredosis, administre naloxona y llame al 911. Si la persona no está respirando, inicie la respiración de rescate hasta que el personal de emergencia llegue.

Las drogas que contienen xilacina pueden causar lesiones que pueden crecer rápidamente y ser difíciles de tratar.



Lesiones causadas por drogas que contienen xilacina.

Lesiones relacionadas con la xilacina

- Pueden aparecer si se inyecta, fuma o esnifa fentanilo con xilacina agregada.
- Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en brazos, piernas, manos o pies. Revise estas áreas con frecuencia para detectar síntomas de nuevas lesiones.
- Las lesiones pueden hacerse más profundas o extenderse a tejidos cercanos. Pueden formar costras gruesas mientras tratan de sanar.
- Son más difíciles de cuidar que otro tipo de lesiones.

Cómo cuidar de las lesiones

- Limpie las lesiones con agua y con jabón al menos cada 2-3 días.
- Aplique ungüento en la gasa y coloque en toda la herida. Cubra con más gasa seca.
- Envuelva con una gasa seca y limpia y asegúrela con cinta adhesiva. Asegúrese de que la envoltura no esté demasiado apretada.
- Cubra el vendaje con una venda ACE, Coban o mangas largas/pantalones.
- Cambie el vendaje cada 1-3 días. Ponga atención a los síntomas para buscar atención médica.

Cuándo buscar atención médica



- La lesión empieza a tener un aspecto inusual (oscura, negra, roja, caliente, dura al tocarla, gruesa, con mal olor, fluido amarillo/verde).
- Si tiene síntomas de infección:
 - » Fiebre



- » Piel caliente, roja, con dolor o hinchada cerca de la lesión
- » Sangre o pus que sale de la lesión
- » Un olor fétido en la lesión
- » Dolor o menor capacidad para mover el brazo o la pierna
- » Se están cayendo pedazos de tejido
- » Hueso o tendón expuesto
- » Nuevo entumecimiento

Más consejos

- Mantenga las lesiones limpias, húmedas y cubiertas.
- Evite usar alcohol/agua oxigenada en las lesiones (esto las secará).
- Evite rascarse las lesiones.
- Si se va a inyectar, practique las siguientes estrategias de reducción de daño:
 - » Empiece poco a poco y despacio.
 - » Cambie los sitios de inyección.
 - » Trate de no inyectarse en las lesiones o alrededor de las mismas.
 - » Use suministros nuevos en cada ocasión y evite compartir suministros usados.
- Para obtener suministros para la reducción del daño o para conectarse con un especialista de extensión entre pares, comuníquese con:
 - » Comuníquese con Health Resources in Action (Recursos de Salud en Acción) para acceder a suministros para la reducción del daño o para conectarse con un especialista de extensión entre pares: 1-833-975-0505
 - » Use los siguientes enlaces para encontrar un proveedor de servicios:
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/HSD/AMH/Pages/Measure110.aspx>
 - ◆ [Medida 110 BHRNS: Encuentre servicios gratuitos de tratamiento y recuperación cerca de usted](#)
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/Pages/Harm-Reduction.aspx>
 - ◆ <https://www.treatmentaccessline.org/>
 - ◆ <https://findtreatment.gov/>



Oregon Health
Authority

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA
Programa de Prevención de Lesiones y Violencia

DIVISIÓN DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO

Unidad de Tratamiento, Recuperación y Prevención de las Adicciones (ATRP, por sus siglas en inglés)

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en otro formato que prefiera sin costo alguno. Comuníquese con el Programa de Prevención de Lesiones y Violencia a IVPP.General@odhsoha.oregon.gov o al 971-673-1222 (voz/mensaje de texto). Aceptamos todas las llamadas de retransmisión.

200-299810 (01/2024) Spanish

Programa:

<https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/OPIOIDS/Pages/FentanylFacts.aspx>