


合併使用芬太尼 (Fentanyl) 和賽拉嗒 (Xylazine) 所造成的傷口

什麼是賽拉嗒？

賽拉嗒（又稱為「tranq」）是一種動物鎮靜劑，現在在全國各地的非法藥物供應鏈中越來越常見。賽拉嗒現在常和其他街頭毒品混在一起，尤其是芬太尼。如同芬太尼，賽拉嗒可能會導致鎮靜、意識喪失、呼吸減慢及藥物依賴等情況。雖然納洛酮對賽拉嗒沒有效用，但若懷疑有用藥過量的情況，請務必提供納洛酮—如有參雜芬太尼或任何其他鴉片類藥物，納洛酮將有幫助。如果您認為有人用藥過量，請提供納洛酮並致電 911。如果對方已沒有呼吸，請開始進行心肺復甦術，直到緊急應變人員抵達為止。

含有賽拉嗒的藥物可能會導致傷口發生，這些傷口可能會迅速擴大並難以治療。



由包含賽拉嗒的藥物所導致的傷口。

賽拉嗒傷口

- 如果您注射、吸食或鼻吸加入賽拉嗒的芬太尼，便可能會出現賽拉嗒傷口。
- 傷口可能會從您身體的任何部分開始出現，尤其是手臂、腿部、雙手或雙腳。經常檢查這些部位以查看是否有新傷口的徵兆。
- 傷口可能會在皮下形成「通道」或擴散至鄰近組織。這些傷口可能會在試圖癒合的期間形成厚的結痂。
- 這些傷口比其他類型的傷口更難照顧。

如何照顧傷口

- 至少每 2-3 天使用肥皂和水清潔一次傷口。
- 將藥膏塗抹在紗布上並覆蓋整個傷口。
使用更多乾的紗布覆蓋傷口。
- 使用乾淨的乾紗布包裹傷口並使用膠布固定。
確認不要包裹太緊。
- 使用彈性繃帶、自黏壓力繃帶或穿著長袖 / 長褲來覆蓋敷料。
- 每 1-3 天更換一次敷料。注意徵兆以尋求醫療照護。

何時該尋求醫療照護


- 傷口開始看起來不對勁（顏色變深、變黑、發紅、發熱、難以觸碰、變厚、散發異味、有黃色 / 綠色分泌物）。
- 如果您出現感染的徵兆：



- » 發燒
- » 傷口四周的皮膚發熱、發紅、疼痛或腫脹
- » 傷口有血液或膿液滲出
- » 傷口散發惡臭
- » 手臂或腿部疼痛或活動能力降低
- » 部分組織剝落
- » 骨頭或肌腱外露
- » 新發生的麻木狀況

更多建議

- 讓傷口保持乾淨、濕潤並覆蓋傷口。
- 避免在傷口上使用酒精 / 過氧化氫 (酒精和過氧化氫會使傷口過乾)
- 避免搔抓傷口。
- 若要進行注射，請採取下述可減少傷害的方法：
 - » 慢慢開始並慢慢進行
 - » 輪流替換注射部位
 - » 盡量不要注射在傷口或傷口周遭部位
 - » 每次均使用新的注射用品並避免與他人共用使用過的用品
- 若想取得可減少傷害的用品或想與同儕推廣專員連繫，請聯絡：
 - » 聯絡 Health Resources in Action 以取得可減少傷害的用品或與同儕推廣專員聯絡：1-833-975-0505
 - » 請使用下方連結以尋找服務提供者：
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/HSD/AMH/Pages/Measure110.aspx>
 - ◆ [Measure 110 行為健康資源網絡 \(BHRNS\)：尋找位於您附近的免費治療和康復服務](#)
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/Pages/Harm-Reduction.aspx>
 - ◆ <https://www.treatmentaccessline.org/>
 - ◆ <https://findtreatment.gov/>



Oregon Health
Authority

公共衛生部
傷害與暴力防治計劃
行為健康部
成癮治療康復與預防單位 (ATRP)

計劃：

<https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/OPIOIDS/Pages/FentanylFacts.aspx>

您可免費獲得本文件的其他語言版本、大字版、盲文版或您所偏好的格式。請透過 IVPP.General@odhsoha.oregon.gov 或 971-673-1222 (語音 / 簡訊) 與傷害與暴力防治計劃聯絡。我們接受所有傳譯電話。