



## Bioseguridad para dueños de conejos

Los dueños de conejos y las operaciones comerciales deben trabajar con su veterinario o funcionario estatal de salud animal para identificar sus factores de riesgo de bioseguridad. Los planes de bioseguridad personalizados para cada sitio deben identificar los factores de riesgo clave, establecer las mejores prácticas y hacer consideraciones para la vacunación u otras herramientas para la mitigación y el control de enfermedades. Los planes pueden variar en función de la ubicación geográfica, el estado de la OIE, la confirmación de la infección en la fauna silvestre o el acceso a la vacuna. Las áreas clave a considerar incluyen:

### Mejores Prácticas Humanas

- Tener calzado de interior y exterior; No use zapatos para exteriores en interiores y viceversa.
- Lávese las manos antes y después de manipular o cuidar conejos y entre grupos.
- No permita visitantes que también tengan conejos.
- No manipule los conejos de otras personas.
- Manipula los conejos enfermos al final.
- Siga las pautas de eliminación para los conejos muertos.

### "Línea de separación" y "Zona de amortiguamiento perimetral"

- Las operaciones comerciales pueden aplicar estos conceptos durante períodos de mayor riesgo, especialmente en áreas donde el RHDV ha afectado a los conejos silvestres.

### Viviendas

- Mantenga a los conejos adentro, si es posible, sobre una superficie impermeable.
- Si los conejos se alojan al aire libre, doble valla para evitar el contacto directo con la vida silvestre.
- Evitar el contacto directo o indirecto con conejos silvestres.
- Aloja a los conejos en conejeras o jaulas fuera del suelo.
- No use forraje, ramas de árboles o pasto para la cama de áreas con vida silvestre infectada.

### Aíslle a los conejos nuevos o a los conejos que regresan de un espectáculo

- Mantenga a los conejos en un área separada durante 30 días antes de permitir el contacto con su colonia.
- Tenga en cuenta los requisitos de salud animal y CVI para el estado de destino.

## **Limpie y desinfecte el equipo (consulte la guía de C&D del USDA)**

- Limpieza
  - Retire todos los residuos orgánicos visibles de los elementos a desinfectar (jaulas, equipos de alimentación, bebederos, etc.). Los artículos hechos de madera es mejor desecharlos o quemarlos.
  - Lave bien los artículos con agua y jabón; Enjuagar bien y dejar secar.
- Desinfección
  - Sature por inmersión o rocíe con 10% de lejía doméstica (hipoclorito de sodio) O 1% de Virkon-S (de DuPont) O productos de peróxido de hidrógeno acelerado (Rescue, Accel, Virox 5).
  - Permita 10 minutos de contacto, luego enjuague y deje secar antes de permitir el contacto con el animal.

## **Vectores de enfermedades de control**

- Moscas, ratas, gatos, perros, pájaros, etc. que pueden mover el virus en sus patas o cuerpo.
- Cercar a los carroñeros y a la vida silvestre (incluidos los conejos salvajes).

## **Alimentación**

- No ponga conejos en el suelo para que coman pasto, etc.
- No recoja forraje al aire libre y ramonee para alimentar a los conejos; Quédese con el alimento peletizado por ahora en áreas donde los conejos silvestres están infectados. Las golosinas pueden incluir verduras crudas de las tiendas de comestibles.
- Abastecerse de heno de las zonas no afectadas.

## **Salud de los conejos**

- Vigila de cerca a tus conejos para ver si se salen de la alimentación, se ven flácidos o deprimidos o se comportan de manera diferente de alguna manera.
- Llama a tu veterinario lo antes posible si notas signos de enfermedad en tus conejos.
- Considere la posibilidad de vacunarse contra el RHDV2 cuando esté disponible (consulte la guía sobre vacunas).

**REPORTE TODOS LOS EVENTOS INUSUALES DE ENFERMEDAD MASIVA Y/O  
MUERTE AL VETERINARIO DEL ESTADO DE OREGÓN**

**503-986-4711**