



Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP)

La influenza aviar es un virus respiratorio de transmisión aérea que se propaga fácilmente entre los pollos a través de las secreciones nasales y oculares, así como del estiércol. El virus puede propagarse de varias maneras de una parvada a otra, por ejemplo, a través de aves silvestres (especialmente acuáticas), por contacto con aves de corral infectadas, por el equipo y en la ropa y el calzado de los cuidadores.

Como productor, debe proteger su parvada y estar atento para notificar los signos de enfermedad. Con las detecciones conocidas de IAAP en aves silvestres y los casos en parvadas de patios traseros en Oregon, todas las granjas avícolas deben seguir medidas estrictas de bioseguridad, vigilar de cerca a las aves y reportar inmediatamente cualquier sospecha de enfermedad.

ANTES DE SABERLO

Si nota lo siguiente...

- aumento de la mortalidad,
- menor consumo de agua, disminución del apetito,
- baja en la producción de huevos,
- aves con dificultad para respirar,
- signos neurológicos o diarrea,

entonces... REPÓRTELO

No dude en llamar al veterinario del Estado de Oregon.

Departamento de Agricultura de Oregon

503-986-4711

AHHotline@oda.oregon.gov

Si ve aves silvestres enfermas o muertas, comuníquese con el ODFW:

Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon

1-866-968-2600

RESPUESTA

Un funcionario estatal o federal se pondrá en contacto con usted para ir a su granja y recoger muestras para analizar la IAAP.

Nota: Si recibe compensación por su parvada, es mejor hacer el reporte antes ya que eso ayuda en el recuento de sus existencias.

0-12 HORAS CUARENTENA

Es probable que reciba una orden de cuarentena de un funcionario estatal.

Una cuarentena significa que solo el personal autorizado puede entrar y salir de su propiedad.

No mueva las aves, los productos avícolas ni el equipo.

INVENTARIO

Un funcionario trabajará con usted en su inventario de aves si es necesario despoblar su parvada.

SOSPECHA

Las muestras se enviarán al laboratorio de diagnóstico de la OSU y los resultados suelen llegar en 24 horas.

Si los resultados son positivos para la influenza aviar, se considera que su parvada es "presuntamente positiva", lo que significa que estamos relativamente seguros, pero no 100% seguros, de que su parvada tiene influenza aviar de alta patogenicidad.

12-36 HORAS "FASE INTERMEDIA"

Si ha recibido un "presunto positivo", un gestor de casos irá a su granja y le guiará en todo.

Normalmente, los funcionarios esperan la confirmación del USDA, pero en determinadas situaciones su parvada puede ser despoblada si sus aves son "presuntamente positivas".

CONFIRMACIÓN

Se enviarán muestras adicionales al laboratorio USDA NVSL para su confirmación. Esto puede tomar unos días y la espera puede ser realmente difícil. Los funcionarios estatales y federales no pueden hacer ningún anuncio público hasta que se reciba la confirmación del USDA.

Una vez que el NVSL confirme la IAAP, podrán comenzar los siguientes pasos y los equipos de respuesta llegarán a su granja, si no lo han hecho ya.

Debe esperar que un especialista en reembolsos se comunique con usted para hablar de la indemnización. La indemnización es una compensación por la pérdida de animales y algunos productos relacionados con la despoblación y el control de la enfermedad.

36-72 HORAS DESPOBLACIÓN DE PARVADAS

Los funcionarios federales y estatales colaborarán con usted para determinar la mejor manera de despoblar su parvada de forma humanitaria. Habrá que llenar muchos formularios y proporcionar mucha información. El gestor de su caso le ayudará.

DISPOSICIÓN

Una vez despoblada la parvada, el siguiente paso es la eliminación. De esto se encargan los funcionarios estatales y federales. Si su parvada es muy grande, esto puede incluir el compostaje en su granja.

¿CÓMO SE ENFERMARON MIS AVES?

Además del personal in situ para la despoblación y eliminación, probablemente recibirá noticias de otros funcionarios para averiguar cómo infectó la IAAP a su parvada, de modo que podamos intentar detener la propagación.

Su papel en la respuesta a la IAAP

TODO EMPIEZA POR LA BIOSEGURIDAD

Si sospecha que su parvada puede tener gripe aviar, comuníquese con el veterinario estatal. Después de eso, deberá tomar una serie de medidas para detener la propagación del virus fuera de su granja. Además, tendrá que preparar sus instalaciones para la respuesta y recopilar información para su gestor de casos de la IAAP.

Aunque aún no sabemos con certeza cómo llegó el virus a su parvada, debe tomar precauciones adicionales para que el virus no salga de su granja y pueda infectar a otra. Tan pronto como complete sus notificaciones, aplique estos protocolos temporales de áreas de bioseguridad:

1. No permita que trabajadores o proveedores de servicios vengan a su granja y luego se vayan a otra. Si tiene una puerta al final del camino de su granja, ciérrela con llave.
2. Cámbiese de ropa y calzado después de estar cerca de las aves de corral, y lávese las manos. Los overoles desechables y las coberturas para zapatos funcionan bien. Utilice mascarillas (K)N95 cuando esté cerca de sus aves de corral para protegerse de una posible exposición al virus de la IAAP.
3. Si es posible, asegúrese de que todos tomen una ducha y se pongan ropa limpia antes de salir de la granja.
4. No visite otras granjas o instalaciones donde pueda haber aves de corral.
5. Consulte al funcionario de salud animal de su estado para ver si hay algo más que pueda hacer para ayudar a detener la propagación.

PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Your case manager, the reimbursement specialist, and the epidemiologist who figure out how the virus got onto your farm, will need information from you. Get prepared by gathering the following information:

- Registros de visitas (por ejemplo, camiones de pienso, entregas de propano y otras personas de servicio)
- Registros de mortalidad
- Registros de animales nuevos o que regresan a la granja
- Zonas donde puede producirse la mezcla de aves con aves acuáticas silvestres

Continúe reforzando la bioseguridad y comience a preparar su área de producción para la despoblación. Siga los pasos siguientes:

- Eleve los conductos de alimentación y agua
- Tenga preparadas las mangueras de agua
- Averigüe cuál es la mejor ruta para entrar y salir de su granja y dónde pueden estacionarse los equipos en un área alejada de las aves infectadas pero con fácil acceso a los graneros.

AUTOCUIDADO

Las primeras 72 horas de la respuesta a la IAAP equivalen a una carrera corta o sprint, pero los esfuerzos de respuesta que vienen después son similares a la preparación para una maratón. Debe asegurarse de que usted, su familia y sus trabajadores hagan del autocuidado una prioridad para mantenerse sanos durante este tiempo.

- Cuídese: intente comer y dormir un poco.
- Está bien pedir ayuda. Usted está viviendo un evento muy estresante. Experimentar problemas de salud mental puede ser confuso y dar miedo. Si necesita hablar con alguien sobre lo que le ocurre, los expertos están a su disposición para ayudarlo.
- Controle diariamente si usted, su familia y los trabajadores presentan síntomas parecidos a la gripe. Reporte los síntomas a su departamento local de salud pública.



Programa de salud animal
635 Capitol St NE Salem, OR
97301 USA 503.986.4680 |
[Oregon.gov/ODA](https://www.oregon.gov/ODA)