

Afecciones y diagnósticos actuales:

- ☐ Congestión crónica de pecho
- ☐ Disfagia
- ☐ Trastorno por reflujo gastroesofágico (GERD, por sus siglas en inglés)
- ☐ Tos persistente
- ☐ Neumonía (en el último año)
- ☐ Ruido al respirar

Tratamientos y terapias:

- ☐ Terapia respiratoria
- ☐ Percusión del tórax (incluido un chaleco de percusión)
- ☐ Drenaje postural
- ☐ Nebulizador
- ☐ Terapia de aerosol en traqueotomía
- ☐ Succión oral que no vaya más allá de la cavidad bucal
- ☐ Succión de las vías respiratorias
- ☐ Aspiración traqueal
- ☐ Succión nasofaríngea
- ☐ Otro tipo de succión
- ☐ Atención para la traqueostomía
- ☐ Cuidado del catéter central
- ☐ Inyecciones/infusiones vía intravenosa (IV)
- ☐ Inyecciones subcutáneas
- ☐ Sonda de yeyunostomía
- ☐ Sonda de alimentación nasogástrica o abdominal (por ejemplo, sonda de gastrostomía, sonda nasogástrica)
- ☐ Supervisión de catéter permanente o suprapúbico
- ☐ Inserción de catéter (cateterización intermitente)

Frecuencia del tratamiento y de la terapia:

- Nunca es necesario
- Necesidad pasada, no actual
- Se necesita, pero no lo recibe
- Se recibe < semanalmente
- Se recibe semanalmente, < 5 días a la semana
- Se recibe 5 o más días a la semana
- Se recibe diariamente
- Se recibe 5 o más veces al día

- ☐ CPAP/BiPAP
- ☐ Ventilador mecánico que no sea CPAP/BiPAP
- ☐ Terapia de oxígeno
- ☐ Colostomía, urostomía y/u otro tipo de ostomía
- ☐ Diálisis peritoneal
- ☐ Hemodiálisis
- ☐ Supervisión de derivación cerebral activa
- ☐ Bomba Baclofen
- ☐ Cuidado de heridas, incluidas úlceras de etapa III o IV
- ☐ Tratamiento de úlceras de etapa III o IV (pérdida de piel y tejido, puede extenderse al músculo o hueso)
- ☐ Terapias de salud del comportamiento, incluida la salud mental
- ☐ Terapias/servicios psiquiátricos
- ☐ Otros: _____