


ការព្យាបាលនៃការឆ្លងរោគរបេងដែលមិនទាន់ចេញមុខ

លទ្ធផលពិនិត្យរោគរបេងអ្នកបង្ហាញថាអ្នកបានឆ្លងរោគរបេងដែលមិនទាន់ចេញមុខ ឬ “LTBI” ។ នៅពេលណាដែលអ្នកមាន LTBI នោះមេរោគរបេង (TB) នៅក្នុងខ្លួនគេគឺ “នៅសំងំ” ប៉ុន្តែមានជីវិតនៅឡើយ ។ មេរោគ TB និង “នៅសំងំ” ដរាបណាដែលខ្លួនរបស់អ្នកអាចវាយតម្លៃជាមួយវាបាន ។ នៅពេលណាដែលអ្នកមាន LTBI នោះអ្នកមិនអាចទៅចម្លង TB ឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតឡើយ ។

ប្រសិនបើខ្លួនរបស់អ្នកឈប់វាយតម្លៃជាមួយមេរោគ TB បានតទៅទៀត នោះវានឹង “ភ្ញាក់ឡើង” ហើយចាប់ផ្តើមរីកឡើង ។ **ការនេះវាអាចកើតឡើងចំពោះជនណាដែលមាន LTBI នៅពេលណាក៏បានដែរ ។** នៅពេលណាដែលមេរោគចាប់ផ្តើមរីកឡើង ហើយរីកឡើង នោះវាត្រូវបានគេហៅថា “ជម្ងឺរបេងសកម្ម ។” មនុស្សដែលមានជម្ងឺរបេងសកម្មអាចឈឺខ្លាំង ហើយអាចចម្លងរោគរបេងទៅអ្នកដទៃបាន ។

តើខ្ញុំអាចការពារជម្ងឺរបេងសកម្មបានដោយរបៀបណាទេ?

ថ្នាំ (Isoniazid -INH) គឺជាថ្នាំពេទ្យជាទូទៅដែលប្រើសំរាប់ព្យាបាល LTBI ។ ថ្នាំ INH ទៅសម្លាប់មេរោគ TB ដែល “កំពុងសំងំ” **នៅមុនពេលដែលវាមានឱកាសធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ ។** ដោយសារតែ មេរោគ TB ខ្លាំង, អញ្ចឹងហើយវាត្រូវការពេលរាប់ខែ ដើម្បីឱ្យថ្នាំនោះទៅសម្លាប់វាបាន ។



ថ្នាំ INH មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប្រសិនបើអ្នកលេបវារាល់ថ្ងៃរហូតទាល់តែត្រូវពេទ្យរបស់អ្នកប្រាប់ថាអ្នកអាចឈប់លេបវាបាន ។ អ្នកគួរតែទៅជួបពេទ្យរបស់អ្នកមួយខែម្តងនៅខ្លះណាដែលអ្នកលេបថ្នាំ INH ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាការព្យាបាលរបស់អ្នកគឺកំពុងទៅដោយរលូន ។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំ បើខ្ញុំមិនទាន់ឈឺឡើយ?

ថ្នាំ INH សម្លាប់មេរោគ TB នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមុនពេលដែលវាមានឱកាស “ភ្ញាក់ឡើង” និងធ្វើឱ្យអ្នកឈឺ ។

តើខ្ញុំគួរតែដឹងអំពីថ្នាំសំរាប់ព្យាបាល LTBI យ៉ាងម៉េចទេ?

មានមនុស្សជាច្រើននាក់លេបថ្នាំ INH រាល់ថ្ងៃដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ ប៉ុន្តែមានកត្តាមួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែសង្កេត:

- ក្តៅខ្លួនលើសពីបីថ្ងៃ
- ពិសារអាហារមិនឆ្ងាញ់, ស្រកទម្ងន់, ឬ មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងដោយមិនមានមូលហេតុអ្វី
- រមួលពោះ ឬក្អកចង្កេះ
- ឈឺពោះរបស់អ្នក
- ទឹកនោមឡើងពណ៌ក្រហម (ពណ៌ទឹកតែ ឬកាហ្វេ)
- ស្បែក ឬភ្នែកឡើងលឿង
- ឡើងរមាស់ ឬកន្ទួលលើស្បែក
- ស្លឹក ឬស្រពន់ដៃ ឬជើងរបស់អ្នក
- ក្អកលើសពីបីសប្តាហ៍ឡើងទៅ
- បែកញើសនៅពេលយប់

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយនេះ, ចូរឈប់លេបថ្នាំ INH ហើយទូរស័ព្ទទៅគ្លីនិករបស់អ្នកជាបន្ទាន់- កុំរងចាំរហូតទាល់តែពេលណាត់ជួបពេទ្យលើកក្រោយ ។

ចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀត:

- **ផឹកស្រានៅខ្លះណា**ដែលអ្នកលេបថ្នាំ INH អាចធ្វើទុក្ខធ្វើមរបស់អ្នកបាន ។ កុំផឹកស្រាបៀរ, ស្រា, ឬគ្រឿងស្រវឹង រហូតទាល់តែអ្នកលេបថ្នាំព្យាបាល LTBI របស់អ្នកឱ្យអស់សិន ។
- ប្រាប់ពេទ្យរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកកំពុងលេបថ្នាំផ្សេងទៀត ឬ**ក៏មានផ្ទៃពោះ** ។



ការព្យាបាលនៃការឆ្លងរោគរបេងដែលមិនទាន់ចេញមុខ – ទំព័រទី 2

តើមានវិធីសាស្ត្រណាមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រយោជន៍ទាំងនេះទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមិនលេបថ្នាំ INH ឬប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត អ្នកអាចឈឺជំងឺរបេងសកម្មបាន ។ នេះអាចកើតមានឡើងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមាន LTBI នៅពេលណាមួយក៏បានដែរ ។

តើខ្ញុំគួរតែធ្វើដូចម្តេចសម្រាប់ប្រសិនបើខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំ BCG រួចហើយ?

នៅប្រទេសដែលជំងឺ TB កើតមានជាធម្មតា មានមនុស្សជាច្រើននាក់បានចាក់ថ្នាំបង្ការដែលគេហៅថា BCG ។ BCG អាចការពារកុមារពីជំងឺរបេងបាន ប៉ុន្តែវាបង្ការបានតែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកដែលបានចាក់ថ្នាំ BCG អាចឆ្លងជំងឺរបេងសកម្មបាន! ប្រសិនបើអ្នកបានចាក់ថ្នាំ BCG រួចហើយ អ្នកក៏អាចនៅការពារខ្លួនរបស់អ្នកបានដោយលេបថ្នាំព្យាបាល LTBI ។

តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ?

ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅរដ្ឋ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀត ចូរព្រមព្រៀងទៅប្រទេសរបស់អ្នកនៅមុនពេលអ្នករើចេញ ។ ពេទ្យអាចជួយអ្នកដើម្បីឱ្យប្រាកដថាអ្នកអាចទៅយកថ្នាំ TB របស់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅ ។

ចូរការពារខ្លួនរបស់អ្នក, គ្រួសាររបស់អ្នក, និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកពីជំងឺរបេង - ចូរលេបថ្នាំ TB របស់អ្នកឱ្យអស់!

តើខ្ញុំអាចចាំថាត្រូវលេបថ្នាំ TB របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវលេបថ្នាំ INH រាល់ថ្ងៃ ។ ប្រសិនបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំជាច្រើនថ្ងៃ នោះថ្នាំនេះប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ ។ ចូរលេបថ្នាំឱ្យអស់រហូតទាល់តែពេទ្យរបស់អ្នកប្រាប់ឱ្យឈប់លេប ។

មានយោបល់មួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចាំបាន:

- ទុកថ្នាំរបស់អ្នកនៅកន្លែងមួយដែលអ្នកនឹងឃើញវារាល់ថ្ងៃ ។
- សុំឱ្យសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិជួយរំលឹកអ្នក ។
- គូសចំណាំនៅលើកាលវិភាគរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃក្រោយពេលអ្នកលេបថ្នាំរបស់អ្នករួច ។
- ប្រើប្រអប់ដាក់ថ្នាំរំលឹក ។
- លេបថ្នាំរបស់អ្នកឱ្យទៀងពេលរាល់ថ្ងៃ ។ ឧទាហរណ៍ក្រោយពេលដុះធ្មេញរួច, ពិសារអាហារពេលព្រឹក, ឬនៅមុនពេលអ្នកចូលដំណេក ។

ប្រសិនបើអ្នកខានលេបថ្នាំ, ចូរសរសេរទុកដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រាប់ទៅគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាកររបស់អ្នកនៅពេលទៅជួបពេទ្យលើកក្រោយ ។

ត្រីនិករបស់អ្នក: _____

ទូរស័ព្ទលេខ#: _____

