

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ສິດກັບກໍລະນີທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV (Monkeypox)) ກໍ່ຕາມ

ເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV) ບໍ່ແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍ. ສູ່ຊີວິດເຊື້ອໄດ້, ທ່ານຕ້ອງມີການສຳຜັດທາງຜິວໜັງກັບໃຜບາງຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV). ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV) ໄດ້ຈາກການຍໍ່ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜູ້ປຸງຖຽນນອນ, ຫຼື ເຄື່ອງຂອງອື່ນໆທີ່ໄດ້ສຳຜັດກັບຜິວໜັງທີ່ເປັນຜືນຄັນຂອງບຸກຄົນປ່ວຍອີກດ້ວຍ. ບົກກະຕິແລ້ວບໍ່ຄ່ອຍມີ, ທີ່ການຕິດເຊື້ອສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາຢູ່ໃກ້ສິດ, ໃກ້ສິດເຊິ່ງໜ້າກັນເປັນເວລາດົນ (ດົນກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ).

ການເຂົ້າໃຈລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຢູ່ໃກ້ສິດກັບໃຜບາງຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV) ແລ້ວ, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກອາດຈະກວດເບິ່ງກັບທ່ານເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. ການກວດເບິ່ງແບບນີ້ຈະຊ່ວຍກຳນົດໄດ້ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ແລະ ວ່າທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຫຼື ບໍ່. ການໃຫ້ວັກຊີນໃຫ້ໃຜບາງຄົນຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ສຳຜັດໃກ້ສິດນັ້ນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ອາການຮ້າຍແຮງໄດ້.

- **ຖ້າທ່ານມີການສຳຜັດໃກ້ສິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃດໜຶ່ງ:** ໃຫ້ຕິດຕາມເບິ່ງອາການໄຂ້ ແລະ ອາການອື່ນໆ ຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແນະນຳໃຫ້ໄປສັກວັກຊີນ.
- **ຖ້າທ່ານມີການສຳຜັດໃກ້ສິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງໃດໜຶ່ງ:** ໃຫ້ຕິດຕາມເບິ່ງອາການໄຂ້ ແລະ ອາການອື່ນໆ ຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ໃຫ້ພິຈາລະນາການໄປສັກວັກຊີນເພື່ອປົກປ້ອງທ່ານຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV) ທີ່ຮ້າຍແຮງ. ບົກສາທາລະນະສຸກເລືອກຂອງເຈົ້າກັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ.

- ຖ້າທ່ານມີການສຳຜັດໃກ້ສິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃດໜຶ່ງ: ໃຫ້ຕິດຕາມເບິ່ງອາການໄຂ້ ແລະ ອາການອື່ນໆ. ບໍ່ຈຳເປັນສັກວັກຊີນ.

ໃຫ້ຕິດຕາມເບິ່ງອາການຕ່າງໆ

ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ສຳຜັດໃກ້ສິດກັບເຊື້ອໄວລັສພະຍາດພິດາດລົງ (hMPXV virus) ຄວນຕິດຕາມເບິ່ງອາການເຫຼົ່ານີ້:

- ຜິ້ນຄັນໃໝ່
- ໄຂ້ ≥ 100.4
- ຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ
- ໄຂ້ໜາວ

ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມຂອງທ່ານສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້. ໃຫ້ຕິດຕາມເບິ່ງອາການຕ່າງໆເປັນເວລາ 21 ວັນ ຫຼັງຈາກການສຳຜັດຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. ອາການອາດຈະເລີ່ມໃນຊ່ວງເວລາໃດກໍ່ເປັນໄດ້ລະຫວ່າງມື້ທີ 5 ຫາ ມື້ທີ 21.

ຖ້າທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ແຍກຕົວທ່ານອອກຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ໂທຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ສຳລັບຂໍ້ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ.

ຄຳແນະນຳ

ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານບໍ່ມີອາການຫຍັງ, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ໄປເຮັດວຽກ, ໄປໂຮງຮຽນ, ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໆໄດ້.

ຫຼືກເວັ້ນການສຳຜັດໃກ້ສິດຕີ່ມອີກກັບບຸກຄົນປ່ວຍຈົນກວ່າຜິ້ນຄັນຂອງບຸກຄົນນັ້ນດີຫາຍຂາດແລ້ວ.

ຢ່າບໍລິຈາກເລືອດ, ນ້ຳອະສຸຈິ, ນົມແມ່, ເນື້ອເຍື່ອ, ຫຼື

ເຮັດການບໍລິຈາກທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງອາການ. ຖ້າທ່ານມີການສຳຜັດໃກ້ສິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃດໜຶ່ງ, ຫຼືກເວັ້ນການເດີນທາງຜ່ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຈົນກວ່າການຕິດຕາມອາການ 21 ມື້ຂອງທ່ານສິ້ນສຸດລົງ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິການເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຜູ້ໜຶ່ງ, ບອກໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການສຳຜັດໃກ້ສິດດັ່ງກ່າວ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ: ສຳລັບບຸກຄົນພິການ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ
ລັດໂອເຣກອນ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການແປພາສາ, ການພິມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ອັກສອນນູນ.
ຕິດຕໍ່ຫາ ໜ່ວຍງານສື່ສານ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເບີ 1-971-673-2411, 711 TTY or
COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us