

임상자가 *Orthopoxvirus* 검사를 받도록 권장하는 경우

다른 사람들이 감염되지 않도록 집에서 격리 조치를 취하십시오. Orthopoxvirus 검사는 원숭이 두창(hMPXV)이 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

결과를 기다리는 동안 다음과 같은 예방 조치를 취하십시오. 검사 결과가 양성인 경우, 의료 서비스 제공자가 중단하라고 말할 때(일반적으로 발진 증상이 해소되었을 때)까지 계속 예방 조치를 취하십시오.

- 예를 들어, 긴 소매나 긴 바지로 발진 부위를 가리십시오.
- 발진 부위를 쉽게 가릴 수 없거나, 발진 부위에서 진물이 나거나, 기침, 인후통 또는 콧물이 있는 경우, 다른 가족 구성원 및 애완동물과 자가 격리 조치를 취하십시오.
- 눈의 감염을 예방하기 위해 콘택트 렌즈의 사용을 피하십시오.
- 발진이 있는 부위를 면도하지 마십시오. 이렇게 하면 바이러스가 퍼질 수 있습니다.
- 가능하면, 다른 가족 구성원과 별도의 욕실을 사용하십시오.
- 드레싱, 붕대 또는 장갑의 폐기물은 밀봉이 가능한 비닐 봉투에 넣으십시오. 밀봉된 이 비닐 봉투는 격리하는 방의 전용 쓰레기통에 버리십시오.
- 쓰레기를 버릴 때는 쓰레기 봉투를 밀봉된 다른 비닐 봉투에 넣어 주십시오.
- 쓰레기 봉투를 제거하고 쓰레기를 취급 및 처리할 때는 장갑을 착용하십시오.
- 꼭 필요한 경우가 아니면 노출되지 않은 사람을 집에 초대하지 마십시오.
- 애완동물 및 다른 동물들과의 접촉을 피하십시오. 가능하면 집에 있는 다른 사람들이 애완동물을 돌봐야 합니다.
- 특히 기침, 인후통 또는 콧물이 있는 경우 수술용 마스크를 착용하십시오.
- 비누와 물 또는 알코올로 문질러서 손을 정기적으로 씻으십시오. 또한 발진 부위와 접촉한 후에 이를 세척하거나 발진 부위와 접촉했을 수 있는 의복, 린넨 또는 표면을 세척하십시오.
- 증상이 악화되거나 호흡 곤란이 있는 경우, 응급 의료 서비스에 전화하십시오. 이들이 적절한 예방 조치를 취할 수 있도록 Orthopoxvirus 검사 결과를 기다리고 있다고 알려주십시오.

가족 중 한 명이 Orthopoxvirus 검사 결과를 기다리고 있거나 양성 반응을 보인 경우:

- 검사 결과를 기다리는 사람과의 밀접한 접촉을 제한하십시오.
- 검사 결과를 기다리는 사람 주위에서 수술용 마스크를 착용하십시오.
- 비누와 물 또는 알코올로 문질러서 손을 정기적으로 씻으십시오. 또한 아픈 사람의 발진 부위와 접촉한 후에 이를 세척하거나 발진 부위와 접촉했을 수 있는 의복, 린넨 또는 표면을 세척하십시오.
- 따뜻한 물과 세제를 사용하여 표준 세탁기에서 침구, 의류 및 기타 세탁물을 세탁하십시오. 표백제를 첨가할 수 있지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 침구에 직접 닿지 않도록 하고 더러워진 세탁물을 흔들지 마십시오.
- 검사 결과를 기다리는 사람과 접시나 식기를 공유하지 마십시오. 더러워진 접시와 식기는 식기 세척기로 세척하거나 따뜻한 물과 비누를 사용하여 손으로 세척해야 합니다. 다른 사람들은 검사 결과를 기다리는 사람이 사용하는 식기를 제대로 씻은 후 사용할 수 있습니다.
- 오염된 표면을 세척하고 소독하십시오. 제조업체의 지침에 따라 가정용 표준 세제/소독제를 사용할 수 있습니다.
- 가정 환경 소독에 대한 CDC의 지침을 따르십시오.

*Orthopox*에 대한 검사가 음성인 경우, 이러한 특별 조치를 중단할 수 있습니다.

문서 접근성: 장애인 또는 영어 이외의 언어를 사용하는 분들을 위해, OHA는 번역본, 큰 글자 인쇄물 또는 점자와 같이 다른 형태로 정보를 제공할 수 있습니다. COVID-19 커뮤니케이션 부서에 1-971-673-2411, 711 TTY 또는 COVID19.LanguageAccess@dhsosha.state.or.us로 연락하십시오.