

COVID-19 백신 접종 및 유방조영술

COVID-19 백신의 부작용과 유방조영술에 미치는 영향에 대한 질문과 우려 사항이 있으실 수 있습니다. 다음은 유방암 검진(유방조영술) 및 COVID-19 백신 접종과 관련하여 알아 두어야 할 사항들입니다.

- COVID-19 백신 접종을 받은 부위 근처의 겨드랑이에 림프절(샘)이 부어 오르는 것이 일반적인가요?** 예, 그렇습니다. 림프절은 신체 항균 시스템의 일부입니다. 림프절의 부기는 신체가 COVID-19 바이러스에 대한 방어 체계를 구축하고 있다는 신호입니다. 백신 접종 직후 너무 빨리 유방조영술을 실시하는 경우, 이러한 부종으로 잘못된 판독을 하게 되는 경우가 있습니다.
- 유방조영술이 예정되어 있으나 아직 백신 접종을 받지 않았다면 어떤 옵션이 있나요?** 의료진과 상담하여 백신 접종 후 얼마 뒤에 유방조영술을 받아야 하는지 문의하십시오. 일부 의료진은 백신 접종을 받기 전에 유방조영술을 받거나 접종을 받은 뒤 4-6주 이후에 유방조영술을 받으라고 제안합니다.
- 이미 백신 접종을 받은 경우에는 어떻게 해야 하나요? 유방조영술을 받아도 되나요?** 예, 받아도 됩니다. 의료진과 상담하여 의학적으로 유방조영술을 받기에 적합한 일정을 파악하십시오.
- COVID-19 백신 접종과 유방조영술은 생명을 구할 수 있습니다.** 정기 검진을 통해 암의 초기 징후와 증상을 파악하면 긍정적인 치료 결과로 이어질 수 있습니다. COVID-19 바이러스는 암 환자에게 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다. 환자 여러분들은 COVID-19 백신 접종을 받으실 것을 권장합니다. 질문이 있을 경우에는 항상 의료진과 상담하십시오.

자료: MD Anderson 암 센터: <https://www.mdanderson.org/cancerwise/7-things-to-know-about-the-covid-19-vaccine-mammograms-and-other-diagnostic-imaging-tests.h00-159459267.html>

문의가 있으십니까? ScreenWise에 이메일(ScreenWise.Info@dhsosha.state.or.us) 또는 전화(971-673-0581)로 연락하십시오.