

La prueba del VIH durante el embarazo

Muchas personas que están infectadas con el VIH no lo saben. Si usted tiene el virus, podría pasárselo al bebé en su vientre, así como a otros seres queridos.

¿Por qué debería hacerme la prueba del VIH?

Las mujeres infectadas con el VIH pueden recibir tratamiento durante el embarazo y disminuir la probabilidad de transmitírsele a sus bebés.

¿Dónde puedo hacerme la prueba del VIH?

- La prueba del VIH debe ordenarse junto con sus otros análisis prenatales.
- Pídale a su proveedor de cuidado prenatal que se asegure de ordenarle una prueba del VIH.
- La mayoría de departamentos de salud locales ofrecen la prueba del VIH gratis o a un costo bajo.
- Otras clínicas médicas como *Planned Parenthood*, también ofrecen la prueba del VIH.

¿Qué sucede si la prueba del VIH sale positiva?

- Si usted está infectada con el VIH, su proveedor de atención médica le ayudará a obtener tratamiento. El tratamiento eliminará, casi por completo, la probabilidad de que le transmita el VIH a su bebé. También podría ayudarle a vivir más tiempo y a llevar una vida más sana.
- NO le dé de lactar (mamar) a su bebé. El VIH está en la leche materna y puede infectar a su bebé después de que nazca.



- Su(s) pareja(s) debe(n) hacerse la prueba del VIH. Si usted consume drogas y comparte implementos con otras personas, éstas también deberían hacerse la prueba.

Para obtener más información

Programa de VIH

971-673-0153

Oregon AIDS/STD Hotline **(Línea de ayuda para personas con SIDA/ETS)**

1-800-777-2437

Northwest Mothers Milk Bank **(Banco de leche materna)**

www.nwmb.org

Human Milk Banking Association of North America

(Asociación de bancos de leche materna de Norteamérica)

www.hmbana.org