



## Ацетаминофен (Tylenol®) Дозировка для младенцев и детей

Показания: лихорадочный и болевой синдромы

| Возраст (лет) | Вес (lbs. = фунты) | Вес (кг = в килограммах) | Дозы (мг = в миллиграммах) | Суспензия: 160 мг/5 мл (мл = в миллилитрах) | Жевательные таблетки для детей (таблетки 160 мг) | Дозировка для взрослых (таблетки 325 мг) | Повышенная дозировка для взрослых (таблетки 500 мг) |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|--|---|
| *             | 6–11 lbs.          | 3–5 кг                   | 40 мг                      | 1,25 мл                                     | --   | --                                       | --  |
| *             | 12–17 lbs.         | 6–7 кг                   | 80–мг                      | 2,5 мл                                      | --   | --                                       | --  |
| *             | 18–23 lbs.         | 8–10 кг                  | 120 мг                     | 3,75 мл                                     | --   | --                                       | --  |
| 2–3 года      | 24–35 lbs.         | 11–15 кг                 | 160 мг                     | 5 мл  | 1 таблетка                                       | --                                       | --  |
| 4–5 лет       | 36–47 lbs.         | 16–21 кг                 | 240 мг                     | 7,5 мл                                      | 1,5 таблетки                                     | --                                       | --  |
| 6–8 лет       | 48–59 lbs.         | 22–27 кг                 | 320 мг                     | 10 мл                                       | 2 таблетки                                       | 1 таблетка                               | --  |
| 9–10 лет      | 60–71 lbs.         | 28–32 кг                 | 400 мг                     | 12,5 мл                                     | 2,5 таблетки                                     | 1 таблетка                               | --  |
| 11 лет        | 72–95 lbs.         | 33–43 кг                 | 480 мг                     | 15 мл                                       | 3 таблетки                                       | 1,5 таблетки                             | 1 таблетка  |
| Старше 11 лет | Более 95 lbs.      | Более 43 кг              | 640 мг                     | 20 мл                                       | 4 таблетки                                       | 2 таблетки                               | 1 таблетка  |

**Периодичность:** Принимать каждые 4–6 часов по мере необходимости. Но не более 5 доз в течение 24 часов.

**Предупреждение по возрасту:** Прием детьми возрастом до 12 недель только после консультации педиатра.

**Важно: Внимательно изучите этикетку на флаконе.** Ацетаминофен (Tylenol®) для младенцев и детей имеет одинаковую концентрацию.

Если вы считаете, что у вашего ребенка жар, измерьте температуру его тела с помощью термометра. Информация о том, как измерить температуру ребенку, приведена здесь:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx>

Дополнительная информация представлена на сайте: [www.healthychildren.org](http://www.healthychildren.org)