

# INSTRUCCIONES PARA LOS NIÑOS CON FIEBRE

El peso de su hijo es: \_\_\_\_\_

La última dosis de Tylenol® (acetaminofeno) que se le dio a su hijo fue \_\_\_\_\_ mg (\_\_\_\_\_ mL) a la(s) \_\_\_\_\_

La última dosis de Motrin® (ibuprofeno) que se le dio a su hijo fue \_\_\_\_\_ mg (\_\_\_\_\_ mL) a la(s) \_\_\_\_\_

\*\*\*Por favor use las tablas siguientes como referencia y fíjese siempre en la concentración (en mg/mL o mg en la etiqueta) de la medicina que tenga en la casa.

El acetaminofeno (Tylenol®) se puede dar **cada 4 a 6 horas**, pero NO de más de 5 dosis en un período de 24 horas. SIEMPRE debe revisar si otras medicinas contienen el ingrediente activo acetaminofeno (es decir, las medicinas de venta libre para la gripe, el Vicodin, el Norco, etc.) e incluir esas medicinas en la dosis total de cada día. Hable con su doctor antes de darle acetaminofeno a cualquier bebé menor de 3 meses de edad.

## TABLA DE DOSIFICACION DE ACETAMINOFENO (TYLENOL®)

| <u>PESO<br/>(LIBRAS)</u> | <u>SUSPENSION LIQUIDA<br/>(160 MG/5ML)</u> | <u>CHILDREN'S<br/>MELTAWAYS<br/>TABLETAS<br/>MASTICABLES<br/>(80 MG)</u> | <u>JR MELTAWAYS<br/>TABLETAS<br/>MASTICABLES<br/>(160 MG)</u> | <u>PESO EN KG<br/>(PERSONAL<br/>MEDICO<br/>SOLAMENTE)</u> |
|--------------------------|--|--|---|---|
| 6-7                      | 1.25 mL                                    | -  | -   | 3   |
| 8-9                      | 1.75 mL                                    | -  | -   | 4   |
| 10-11                    | 2.5 mL                                     | -  | -   | 5   |
| 12-13                    | 2.75 mL                                    | -  | -   | 6   |
| 14-16                    | 3 mL                                       | -  | -   | 7   |
| 17-18                    | 3.75 mL                                    | -  | -   | 8   |
| 19-22                    | 4 mL                                       | -  | -   | 9-10  |
| 23-27                    | 5 mL                                       | 2  | 1   | 11-12   |
| 28-31                    | 6 mL                                       | 2  | 1   | 13-14   |
| 32-35                    | 7 mL                                       | 3  | 1 y media   | 15-16   |
| 36-39                    | 8 mL                                       | 3  | 1 y media   | 17-18   |
| 40-44                    | 9 mL                                       | 3  | 1 y media   | 19-20   |
| 45-48                    | 10 mL                                      | 4  | 2   | 21-22   |
| 49-53                    | 11 mL                                      | 4  | 2   | 23-24   |
| 54-57                    | 12 mL                                      | 5  | 2 y media   | 25-26   |
| 58-62                    | 13 mL                                      | 5  | 2 y media   | 27-28   |
| 63-66                    | 14 mL                                      | 5  | 2 y media   | 29-30   |
| 67-71                    | 15 mL                                      | 6  | 3   | 31-32   |
| 72-75                    | 16 mL                                      | 6  | 3   | 33-34   |
| 76-80                    | 17 mL                                      | 7  | 3 y media   | 35-36   |
| 81-84                    | 18 mL                                      | 7  | 3 y media   | 37-38   |
| 85-88                    | 19 mL                                      | 7  | 3 y media   | 39-40   |
| 89-100                   | 20 mL                                      | 8  | 4   | 41-45   |

**El ibuprofeno (Motrin®, Advil®) se puede dar cada 6 a 8 horas. No se deben exceder 4 dosis en un período de 24 horas. Hable siempre con su doctor antes de darle ibuprofeno a cualquier bebé menor de 6 meses de edad.**

## **TABLA DE DOSIFICACION PARA EL IBUPROFENO (MOTRIN®, ADVIL®)**

| PESO<br>(EN<br>LIBRAS) | GOTAS PARA<br>BEBES<br>(50MG/1.25 ML) | SUSPENSION PARA<br>NIÑOS (100MG/5ML) | TABLETAS<br>MASTICABLES<br>(50 MG) | TABLETAS<br>MASTICABLES JR<br>(100MG) | PESO EN KG<br>(PERSONAL MÉDICO<br>SOLAMENTE) |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 12-13                  | 1.5 mL                                | 3 mL                                 | -                                  | -                                     | 6  |
| 14-16                  | 1.75 mL                               | 3.5 mL                               | -                                  | -                                     | 7  |
| 17-18                  | 2 mL                                  | 4mL                                  | -                                  | -                                     | 8  |
| 19-22                  | 2.25 mL                               | 4.5 mL                               | -                                  | -                                     | 9-10   |
| 22-27                  | 2.5 mL                                | 5 mL                                 | 2                                  | 1                                     | 11-12  |
| 28-31                  | 3 mL                                  | 6 mL                                 | 2                                  | 1                                     | 12-14  |
| 32-35                  | 3.5 mL                                | 7 mL                                 | 3                                  | 1 y media                             | 15-16  |
| 36-39                  | 4 mL                                  | 8 mL                                 | 3                                  | 1 y media                             | 17-18  |
| 40-44                  | 4.5 mL                                | 9 mL                                 | 3                                  | 1 y media                             | 18-20  |
| 45-48                  | 5 mL                                  | 10 mL                                | 4                                  | 2                                     | 20-22  |
| 49-53                  | 5.5 mL                                | 11 mL                                | 4                                  | 2                                     | 22-24  |
| 54-57                  | 6 mL                                  | 12 mL                                | 5                                  | 2 y media                             | 25-26  |
| 58-62                  | 6.5 mL                                | 13 mL                                | 5                                  | 2 y media                             | 26-28  |
| 63-66                  | 7 mL                                  | 14 mL                                | 5                                  | 2 y media                             | 29-30  |
| 67-71                  | 7.5 mL                                | 15 mL                                | 6                                  | 3                                     | 30-32  |
| 72-75                  | 8 mL                                  | 16 mL                                | 6                                  | 3                                     | 33-34  |
| 76-80                  | 8.5 mL                                | 17 mL                                | 7                                  | 3 y media                             | 35-36  |
| 81-84                  | 9 mL                                  | 18 mL                                | 7                                  | 3 y media                             | 37-38  |
| 85-88                  | 9.5 mL                                | 19 mL                                | 7                                  | 3 y media                             | 39-40  |
| 89-100                 | 10 mL                                 | 20 mL                                | 8                                  | 4                                     | 40-46  |

Por favor use la siguiente tabla con horario para llevar un registro de las medicinas, la temperatura y las dosis que haya dado a su hijo. Es muy importante dar la cantidad correcta de medicina para el peso de hijo. Use siempre el instrumento proporcionado por el fabricante para medir la medicina y revise todas las demás medicinas que le esté dando a su hijo para ver si contienen acetaminofeno o ibuprofeno.