

# Randall Children's Hospital

## Tabla de dosis de acetaminofeno (Tylenol®)

El peso de su hijo hoy es \_\_\_\_\_ libras

- Adminístrelo cada 4-6 horas, según sea necesario para el tratamiento del dolor o la fiebre; no administre más de 5 dosis por día. Agite bien los líquidos antes de usar.
- No lo use en bebés de menos de 4 semanas, a menos que lo indique el médico de su hijo.

Peso del niño	5-7 lb	8-9 lb	10-11 lb	12-16 lb	17-22 lb	23-33 lb	34-44 lb	45-66 lb	67-88 lb	Más de 88 lb
Líquido de 160 mg/5 mL para niños y bebés	1 ml (32 mg)	1.5 ml (48 mg)	2 ml (64 mg)	2.5 ml (80 mg)	3.8 ml (121 mg)	5 ml (160 mg)	7.4 ml (237 mg)	10 ml (320 mg)	15 ml (480 mg)	20 ml (640 mg)
Comprimidos masticables de 80 mg para niños	---	---	---	1 comprimido (80 mg)	1 ½ comprimido (120 mg)	2 comprimidos (160 mg)	3 comprimidos (240 mg)	4 comprimidos (320 mg)	6 comprimidos (480 mg)	8 comprimidos (640 mg)
Comprimidos masticables de 160 mg para niños	---	---	---	½ comprimido (80 mg)	---	1 comprimido (160 mg)	1 ½ comprimido (240 mg)	2 comprimidos (320 mg)	3 comprimidos (480 mg)	4 comprimidos (640 mg)
Comprimidos de 325 mg para adultos	---	---	---	---	---	½ comprimido (162.5 mg)	---	1 comprimido (325 mg)	1 ½ comprimido (487.5 mg)	2 comprimidos (650 mg)
Comprimidos de 500 mg para adultos	---	---	---	---	---	---	½ comprimido (250 mg)	---	1 comprimido (500 mg)	---

## Tabla de dosis de ibuprofeno (Motrin®, Advil®)

- Adminístrelo cada 6-8 horas, según sea necesario para el tratamiento del dolor o la fiebre. Agite bien los líquidos antes de usar.
- No lo use en bebés de menos de 6 meses, a menos que lo indique el médico de su hijo.

Peso del niño	13-16 lb	17-21 lb	22-24 lb	25-31 lb	32-42 lb	43-50 lb	51-64 lb	65-84 lb	Más de 84 lb
Gotas de 50 mg/1.25mL para bebés	1.5 ml (60 mg)	2 ml (80 mg)	2.5 ml (100 mg)	3 ml (120 mg)	--	--	--	--	--
Líquido de 100 mg/5 mL para niños	3 ml (60 mg)	4 ml (80 mg)	5 ml (100 mg)	6 ml (120 mg)	7.4 ml (148 mg)	10 ml (200 mg)	12 ml (240 mg)	15 ml (300 mg)	20 ml (400 mg)
Comprimidos masticables de 50 mg para jóvenes	--	1 ½ comprimido (75 mg)	2 comprimidos (100 mg)	2 ½ comprimidos (125 mg)	3 comprimidos (150 mg)	4 comprimidos (200 mg)	5 comprimidos (250 mg)	6 comprimidos (300 mg)	8 comprimidos (400 mg)
Comprimidos masticables de 100 mg para jóvenes	--	--	1 comprimido (100 mg)	--	1 ½ comprimido (150 mg)	2 comprimidos (200 mg)	2 ½ comprimidos (250 mg)	3 comprimidos (300 mg)	4 comprimidos (400 mg)
Comprimidos de 200 mg para adultos	--	--	½ comprimido (100 mg)	½ comprimido (100 mg)	--	1 comprimido (200 mg)	1 comprimido (200 mg)	1 ½ comprimido (300 mg)	2 comprimidos (400 mg)

- **Cómo medir la dosis:**
  - Use la jeringa oral o el gotero que viene con el medicamento. Si no tiene uno de estos, puede conseguir una jeringa para medicamentos en su farmacia local.
  - Nunca use cucharas de cocina ya que pueden llevar a que accidentalmente le dé la cantidad incorrecta de medicamento a su hijo.
  - Algunos comprimidos están marcados (una línea que cruza la superficie del comprimido) y pueden dividirse fácilmente por la mitad; si el comprimido no está marcado, es posible que necesite un cortador de píldoras para cortar el comprimido por la mitad más fácilmente.
- **Cómo administrar la dosis:**
  - Acetaminofeno: evite los productos combinados que contienen acetaminofeno adicional para evitar darle a su hijo demasiado de este medicamento por accidente.
  - Ibuprofeno
    - Evite los productos combinados que contienen ibuprofeno adicional para evitar darle a su hijo demasiado de este medicamento por accidente.
    - Puede administrarse con alimentos o leche si es necesario para evitar el malestar estomacal.
    - Evite usarlo si su hijo tiene diarrea o vómitos ya que la deshidratación puede aumentar el riesgo de daño a los riñones del niño.
- **Cómo se suministran los medicamentos:**
  - Acetaminofeno
    - Líquido para bebés: tiene la misma cantidad de medicamento que el líquido para niños.
    - Comprimidos masticables: pueden masticarse o tragarse enteros.
    - Comprimidos que se derriten o se disuelven rápido: se derriten en la boca; también se pueden masticar o tragar enteros.
    - Supositorios rectales (FeverAll): vienen en 80 mg, 120 mg, 325 mg y 650 mg. La dosis rectal es la misma que la dosis que se administra por vía oral.
    - Liberación prolongada: **NO** apto para uso en niños.
  - Ibuprofeno
    - Gotas para bebés: **MÁS** medicamento en una cantidad menor de líquido.
    - Comprimidos masticables: pueden masticarse o tragarse enteros.



[www.legacyhealth.org/kidsonly](http://www.legacyhealth.org/kidsonly)

Partners in transforming care · CARES Northwest · Legacy-GoHealth Urgent Care · Legacy-United Surgical Partners · PacificSource Health Plans · Unity Center for Behavioral Health

Thank you for using [www.freepdfconvert.com](http://www.freepdfconvert.com) service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

<https://www.freepdfconvert.com/membership>