



## Ибупрофен (Motrin®/Advil®) в дозировке для младенцев и детей

Для применения в качестве жаропонижающего, болеутоляющего и противовоспалительного средства

| Возраст       | Вес<br>(фунты = в фунтах) | Вес<br>(кг = в<br>килограммах) | Дозы<br>(мг = в<br>миллиграммах) | Капли для младенцев<br>(50 мг/1,25 мл)<br>(мл = в миллилитрах) | Раствор для детей<br>(100 мг/5 мл)<br>(мл = в<br>миллилитрах) | Дозировка для<br>детей (таблетки<br>100 мг) | Дозировка<br>для взрослых<br>(таблетки 200<br>мг) |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| 6-11 месяцев  | 12-17 фунтов              | 6-7 кг                         | 50 мг                            | 1,25 мл  | 2,5 мл  | --  | --  |
| 12-23 месяцев | 18-23 фунтов              | 8-10 кг                        | 75 мг                            | 1,875 мл   | 4 мл  | --  | --  |
| 2-3 года      | 24-35 фунтов              | 11-15 кг                       | 100 мг                           | --   | 5 мл  | 1 таблетка                                  | --  |
| 4-5 лет       | 36-47 фунтов              | 16-21 кг                       | 150 мг                           | --   | 7,5 мл  | 1,5 таблетки                                | --  |
| 6-8 лет       | 48-59 фунтов              | 22-27 кг                       | 200 мг                           | --   | 10 мл   | 2 таблетки                                  | 1 таблетка  |
| 9-10 лет      | 60-71 фунтов              | 28-32 кг                       | 250 мг                           | --   | 12,5 мл   | 2,5 таблетки                                | 1 таблетка  |
| 11 лет        | 72-95 фунтов              | 33-43 кг                       | 300 мг                           | --   | 15 мл   | 3 таблетки                                  | 1,5 таблетки                                      |
| Старше 11 лет | Более<br>95 фунтов        | Более<br>43 кг                 | 400 мг                           | --   | 20 мл   | 4 таблетки                                  | 2 таблетки  |

**Периодичность:** Принимать каждые 6-8 часов при необходимости.

**Ограничения по возрасту:** Запрещено давать детям в возрасте младше 6 месяцев при отсутствии соответствующих указаний педиатра.

**Важно! Внимательно изучите этикетку на флаконе.** Для младенцев и детей применяется разная концентрация ибuproфена (Motrin®) отличается.

Если вам кажется, что у ребенка жар, измерьте температуру термометром. Как измерить температуру ребенку, смотрите по ссылке:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx>

Дополнительная информация представлена на сайте: [www.healthychildren.org](http://www.healthychildren.org)