



Edad (años)	Peso (lb. = libras)	Peso (kg = kilogramos)	Dosis (mg = miligramos)	Suspensión: 160 mg/5 ml (ml = mililitro)	Masticables para niños (comprimidos de 160 mg)	Concentración para adultos (comprimidos de 325 mg)	Extra fuerte para adultos (comprimidos de 500 mg)
*	6-11 lb.	3-5 kg	40 mg	1.25 ml	--	--	--
*	12-17 lb.	6-7 kg	80 mg	2.5 ml	--	--	--
*	18-23 lb.	8-10 kg	120 mg	3.75 ml	--	--	--
2-3 años	24-35 lb.	11-15 kg	160 mg	5 ml	1 comprimido	--	--
4-5 años	36-47 lb.	16-21 kg	240 mg	7.5 ml	1.5 comprimidos	--	--
6-8 años	48-59 lb.	22-27 kg	320 mg	10 ml	2 comprimidos	1 comprimido	--
9-10 años	60-71 lb.	28-32 kg	400 mg	12.5 ml	2.5 comprimidos	1 comprimido	--
11 años	72-95 lb.	33-43 kg	480 mg	15 ml	3 comprimidos	1.5 comprimidos	1 comprimido
Mayor de 11 años	Más de 95 lb.	Más de 43 kg	640 mg	20 ml	4 comprimidos	2 comprimidos	1 comprimido

Frecuencia: Repetir cada cuatro o seis horas, según sea necesario. No dar más de cinco dosis en 24 horas.

Precaución por edad: Para niños menores de 12 semanas, consultar con el profesional de la salud de su hijo antes de dárselo.

No olvidar: Lea la etiqueta del frasco con atención. La concentración del paracetamol (Tylenol®) para bebés y para niños es la misma.

Si cree que su hijo tiene fiebre, tómele la temperatura con un termómetro. Aprenda a tomarle la temperatura a su hijo en:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx>

Para obtener más información, visite www.healthychildren.org