



## Acetaminophen (Tylenol®) Liều Dùng cho Trẻ Em và Trẻ Sơ Sinh

Chỉ định sử dụng bao gồm: hạ sốt và kiểm soát cơn đau

Tuổi (năm)	Cân Nặng (lbs. = pound)	Cân Nặng (kg = kilogram)	Liều (mg = milligram)	Huyền dịch: 160mg/5mL (mL = mililit)	Viên Nhai cho Trẻ Em (viên nén 160 mg)	Tăng Lực cho Người Lớn (viên nén 325mg)	Siêu Tăng Lực cho Người Lớn (viên nén 500mg)
*	6-11lbs.	3-5kg	40 mg	1,25 mL	--	--	--
*	12-17 lbs.	6-7 kg	80 mg	2,5 mL	--	--	--
*	18-23 lbs.	8-10 kg	120 mg	3,75 mL	--	--	--
2-3 tuổi	24-35 lbs.	11-15 kg	160 mg	5 mL	1 viên nén	--	--
4-5 tuổi	36-47 lbs.	16-21 kg	240 mg	7,5 mL	1,5 viên nén	--	--
6-8 tuổi	48-59 lbs.	22-27 kg	320 mg	10 mL	2 viên nén	1 viên nén	--
9-10 tuổi	60-71 lbs.	28-32 kg	400 mg	12,5 mL	2,5 viên nén	1 viên nén	--
11 tuổi	72-95 lbs.	33-43 kg	480 mg	15 mL	3 viên nén	1,5 viên nén	1 viên nén
Trên 11 tuổi	Nặng hơn 95 lbs.	Nặng hơn 43 kg	640 mg	20 mL	4 viên nén	2 viên nén	1 viên nén

**Tần suất:** Dùng sau mỗi 4-6 giờ nếu cần thiết. Không dùng nhiều hơn 5 liều trong 24 giờ.

**Đề phòng tuổi tác:** Đối với trẻ dưới 12 tuần tuổi, kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của con quý vị trước khi sử dụng.

**Thận trọng: Vui lòng đọc kỹ nhãn trên chai.** Nồng độ acetaminophen (Tylenol®) cho trẻ em và trẻ sơ sinh là giống nhau.

Nếu quý vị nghĩ rằng con mình bị sốt, hãy đo nhiệt độ bằng nhiệt kế. Tìm hiểu cách đo nhiệt độ cho quý vị tại:

<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/fever/Pages/How-to-Take-a-Childs-Temperature.aspx>

Để biết thêm thông tin, truy cập [www.healthychildren.org](http://www.healthychildren.org)