



# 炭疽病

## 什麼是炭疽病？

炭疽病是一種最常見於動物中的細菌性疾病，例如牛、豬、綿羊及山羊。炭疽病是由能夠形成孢子的細菌造成。孢子會保護炭疽病細菌，使細菌存活很長時間。人類很少會患炭疽病，但可能透過以下途徑感染炭疽病：處理患有炭疽病的動物或含有炭疽病孢子的材料、吃感染病菌的肉、吸入空氣中的孢子。炭疽病不會在人與人之間傳播。

## 炭疽病的類型及症狀

炭疽病分為三種——每一種都會因感染途徑的不同而出現不同的症狀。症狀一般會在接觸孢子後的一至七天內出現，但有時也會到60天後才發病。感染炭疽病的三種途徑是：

- **吸入型炭疽：**這是最嚴重的一種炭疽病，因將炭疽孢子吸入肺部而引起。一開始，這種感染看起來象流感或普通感冒。患病的人會發燒、咳嗽、頭痛、打寒戰、身體虛弱、呼吸困難及感到胸部不適。幾天後，可能出現嚴重呼吸困難及休克。如果不立即醫治，這種炭疽感染會有生命危險。如果是在故意暴露的情況下，把炭疽病當作武器的人很可能把炭疽病菌散發到空氣中，使人們吸入。
- **皮膚炭疽病：**因炭疽病透過皮膚上的傷口或抓破的皮膚進入人體而引發。最早出現的一種症狀是起使人發癢的腫塊。然後可能會發小水泡，小水泡變成中間發黑的無痛感的潰瘍。淋巴腺紅腫是另一種症狀。
- **消化道炭疽：**因吞下炭疽病孢子而造成。這會對腸道造成傷害。早期症狀包括嘔吐、噁心、沒有食欲及發燒。然後可能出現肚子痛、吐血及嚴重瀉肚子的症狀。

## 如果你懷疑有炭疽病感染

- 如果出現症狀，應就醫。如果你認為有人故意讓你接觸炭疽病菌，立即向執法部門報告。
- 如果你收到可能裝有炭疽病菌的信件或包裹：
  - 把信件或包裹輕輕放下。不要用手去摸 — 因為這樣可能會使孢子進入空氣中。
  - 立即用肥皂及溫水徹底洗手。
  - 撥 9-1-1 電話，報告發生的情況。聽從接線員的指示，等候援助人員到來。
  - 請牢記：不要自己處理信件或包裹。

## 炭疽病的治療方法

- 只有在你的醫生或地方衛生部門告訴你用抗生素預防或治療炭疽病時，才可以這樣做。所有炭疽病都必須立即治療。炭疽病不會在人與人之間傳染，因此只有在直接接觸炭疽病後才需要接受治療。接觸病人（例如家人、朋友或同事）不會有危險。

Oregon  
**Health**  
Authority

Public Health Division  
800 NE Oregon St.  
Suite 465 B  
Portland, OR 97232

網站：  
[healthoregon.org/  
preparedness](http://healthoregon.org/preparedness)

971-673-1315

HSPR Pub 12-3-12  
Traditional Chinese