

Раны, возникшие в результате использования фентанила с ксилазином

Что представляет собой ксилазин?

Ксилазин (транквилизатор) – это транквилизатор для животных, который все чаще встречается в незаконном обороте наркотиков по всей стране. Его смешивают с другими уличными наркотиками, особенно с фентанилом. Как и фентанил, ксилазин может вызывать седативный эффект, потерю сознания, замедление дыхания и зависимость. Несмотря на то, что налоксон не действует на ксилазин, при подозрении на передозировку всегда следует давать налоксон – он поможет, если речь идет о фентаниле или любом другом опиоиде. Если вы считаете, что у человека возникла передозировка, введите налоксон и позвоните 911. Если человек не дышит, начните делать ему искусственное дыхание, пока не придут сотрудники службы спасения.

Препараты, содержащие ксилазин, могут вызывать раны, которые развиваются скоротечно и трудно поддаются лечению.



Раны, вызванные лекарствами, содержащими ксилазин.

Раны от ксилазина

- Могут появиться, если вы вводите, курите или вдыхаете фентанил с добавлением ксилазина.
- Могут появиться на любом участке тела, особенно на руках, ногах, кистях или стопах. Проверяйте эти места часто на наличие признаков новых ран.
- Раны могут образовывать «туннели» и распространяться на окружающие ткани. В процессе заживления на них могут образовываться толстые струпья.
- Ухаживать за ними сложнее, чем за другими видами ран.

Как ухаживать за ранами?

- Промывайте раны водой с мылом не реже одного раза в 2-3 дня.
- Нанесите мазь на марлю и приложите на всю рану. Приложите дополнительный слой сухой марли.
- Оберните рану чистой сухой марлей и закрепите ее лейкопластырем. Убедитесь, что повязка не слишком тугая.
- Накройте повязку бинтом ACE, эластичным бинтом или длинными рукавами/штанами.
- Меняйте повязку каждые 1-3 дня. Следите за признаками, требующими обращения за медицинской помощью.

Когда следует обратиться за медицинской помощью?



- Рана начинает выглядеть необычно (темнеть, чернеть, краснеть, жечь, становится твердой на ощупь, уплотняться, дурно пахнуть, иметь желтые/зеленые выделения).
- Если у вас есть признаки инфекции:



- » высокая температура;
- » теплая, покрасневшая, болезненная или опухшая кожа рядом с раной;
- » кровотечение или нагноение раны;
- » неприятный запах из раны;
- » боль или снижение способности двигать рукой или ногой;
- » отпадение кусочков ткани;
- » открытая кость или сухожилие;
- » ранее не наблюдавшееся онемение.

Дополнительные советы

- Поддерживайте чистоту и влажность раны и накладывайте повязку.
- Избегайте использования спирта/перекиси водорода для обработки ран (они высушивают их).
- Избегайте расчесывания ран.
- Если вы вводите инъекции, используйте приведенные ниже стратегии снижения вреда:
 - » Начинайте с меньших доз и вводите медленно.
 - » Чередуйте места инъекций.
 - » Старайтесь не вводить инъекции в раны и вокруг них.
 - » Каждый раз используйте новые принадлежности и не пользуйтесь уже использованными.
- Для того, чтобы приобрести менее опасные принадлежности или связаться со специалистом по работе с населением:
 - » Свяжитесь с организацией Health Resources in Action, чтобы получить доступ к менее опасным принадлежностям или для связи со специалистом по работе с населением: 1-833-975-0505.
 - » Для поиска поставщика услуг, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками:
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/HSD/AMH/Pages/Measure110.aspx>
 - ◆ [Мера 110 BHRNS: Найдите бесплатные услуги по лечению и реабилитации рядом с вами](#)
 - ◆ <https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/Pages/Harm-Reduction.aspx>
 - ◆ <https://www.treatmentaccessline.org/>
 - ◆ <https://findtreatment.gov/>



Oregon
Health
Authority

200-299810 (01/2024) Russian

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Программа профилактики травматизма и насилия

ОТДЕЛ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Подразделение по лечению, восстановлению и профилактике зависимостей (ATRP)

Вы можете бесплатно получить этот документ на других языках, напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в другом удобном для вас формате. Свяжитесь с Программой профилактики травматизма и насилия по адресу IVPP.General@odhsoha.oregon.gov или тел. 971-673-1222 (оператор/смс). Мы принимаем все звонки по линии трансляционной связи.

Программа:

<https://www.oregon.gov/oha/PH/PREVENTIONWELLNESS/SUBSTANCEUSE/OPIOIDS/Pages/FentanylFacts.aspx>